。选用于导讲制到饴盛

赴式选会

。用跟此单宠跟同侦食已下品本

量陈

。次三日静 ，9g.0 次薛 ：（土以党 SI）誉患主化青双人加

SI 下以党

癯鼜

D饱ο°82昨害患麻橄攵堕I饱ο°τ£昔恨仑，中鲶灰禾副饱品本甲欺示显告班昔

垂癯鼜。癯鼜卦壑主饱弟嗑手式派表癯鼜饱害患麻橄攵堕I。癯鼜派出害患麻克

爷，派出目个一茶饱

对精子生成的影响

男性患者服用本品期间以及停药后3个月内应

匹克病患者中观察到轻度血小板计数减少，但不伴出血。在入组临床试验的患者中，40%-50%患者的基线血小板计数低于正常值下限。建议对这些患者进行血小板计数监测。

&型尼曼匹克病

应定期，如每6个月对C型尼曼匹克病患者使用本品治疗神经症状的获益进行评估；应在服用本品至少1年后重新评估是否继续使用本品治疗。

儿童患者的生长障碍

有报道指出一些C型尼曼匹克病的儿童患者在使用本品治疗的早期出现生长发育减慢，起初表现为体重增加的减少同时伴有或在此之后出现身高增加的减少。对使用本品治疗的儿童

环节更果括胞帕后森表中缩发照技

，[0121.1 ，[E1C.5- ID ₀₀₂₆] 525.0- ：胜计设无 ，[894.5 ，0300.0- ID ₀₀₂₆] 61C.1 ：胜帕

0 = q ，4E8.3 ，[569.0- ID ₀₀₂₆] 1C2.1- ：（AVODNA 的计能区心中，直线基飞轰表）

的起始病。C 型尼曼匹克病是一种以细胞内脂质运输受损为特征的神经退行性疾病。神经症状被认为是继发于糖鞘脂类在神经元细胞和神经胶质细胞内的异常蓄积。C 型尼曼匹克病小鼠模型经口重复给予麦：

光p1加剂DUA）响温萘显

气撒力的冬量中疲屈。肿气撒力允溜出顺欲下中更粪及疲屈去。加回中更

示肼，恒小02I式膜衰半末终的卦乖堆效中涨血。°02的量胨占，册后林表缀翱卧，宝鉴娥末尚肿气撒力的膜衰半头跋坐赵。肿气撒力的膜衰半头跋首具帧冬宠帧。

。更浓的肿气撒力册后林表恒态龛垃跋堤达共降聚

断非

公，断非细智经要主册后林表

。维链小姿宠条关誊显苏计不间么（滋帧

（了以及发2I）童儿

式德手及以青患童儿的前撤文堤£的发2I - £式德手于自来跳嫂学七应外范

，会词蹬删计批降面表本限班量胨的次三日辞，g㎜00C次辞。青患前克迈曼贝堤